HÉTÉROCÈRES NOUVEAUX DE L'AMÉRIQUE DU SUD

par Paul Dognin.

Eucereon costinotatum n. sp. — 30 mill. — Supérieures avec le milieu de la côte et la plupart des nervures largement noires, les espaces intranervuraux presque partout lavés de blanc jaunâtre ainsi que les premier et dernier tiers de la côte ; une grande tache blanche subapicale s'arrêtant sur la 5 va se réunir au blanc de la côte et semble bien caractériser cette espèce; frange grise à extrémité blanche. Dessus des inférieures noir, la côte lavée de blanc sale, la frange noire. Dessous des quatre ailes noir, les supérieures avec seulement le dernier tiers de la côte blanc et la tache subapicale comme en dessus, bien nettement dessinée. Front noir; collier ponctué de blanc jaunâtre; ptérygodes noires liserées de blanc jaunâtre ; thorax noir et blanc jaunâtre; dessus de l'abdomen noir, le dessus de l'anus d'un beau jaune, le dessous noir ; dessous de l'abdomen blanc sale, le dernier anneau noir ; pattes à dessus noir et dessous blanc sale.

Paranapanema, Brésil; une ♀.

Se range auprès de *costulatum* H. Sch.

Eucereon intranotatum n. sp. — 26 mill. — Dessus des supérieures noir brunâtre pâle, les espaces intranervuraux généralement lavés de blanc jaunâtre pâle, de même le premier tiers de la côte; au delà de la cellule une tache ovale blanche, allant de la sous-costale jusque vers la 4, la côte restant noir brunâtre. Frange noir brunâtre pâle coupée de blanc sale à la 2. Dessus et dessous des inférieures noir brunâtre pâle, mi-transparents au centre, la frange concolore. Dessous des premières ailes noir brunâtre pâle uniforme, la tache subapicale blanche comme en dessus. Front noir brunâtre avec quelques poils blanc sale; tête noir brunâtre avec deux gros points jaune vif; ptérygodes noir brunâtre liserées de jaune vif; thorax et dessus du corps noir brunâtre pâle, l'anus restant noir brunâtre; pattes noir brunâtre; dessous de l'abdomen lavé de blanc sale sur les premiers anneaux.

Loja; une ♀.

Nystalea nigritorquata n. sp. — 57 mill. — Cette espèce rappelle un peu certaines de nos Cucullies. Dessus des supérieures gris cendré taché de roux et de brun notamment le long de la côte et dans la seconde moitié de l'aile, les nervures plus ou moins indiquées en noir; une fine ligne subterminale chevronnée; un point

terminal noir très marqué immédiatement au-dessus de l'angle interne entre 1 et 2 ; frange grise coupée de noir entre les nervures. Dessus des inférieures blanc hyalin avec une bordure terminale brune plus large à la côte et à l'apex, les nervures en partie brunes. Frange blanche. Dessous des supérieures d'un brun assez uniforme, la côte ponctuée de blanc vers l'apex ; dessous des inférieures comme dessus, sauf que les nervures restent blanches. Tête et thorax gris, collier largement brun ; pattes et abdomen bruns.

Popayan ; un ♂ bien frais.

Boriza trajecta n. sp. — 43 mill. — Dessus des supérieures gris, traversé longitudinalement à la hauteur de la cellule par une large ligne noire qui finit à la côte sur la 5, puis transversalement au second tiers de l'aile par une double rangée de points nervuraux. Franges concolores. Dessous des supérieures blanc, la côte et la frange grisâtres. Dessus et dessous des inférieures blanc pur ainsi que la frange. Antennes à double pectination, l'extrémité filiforme.

Paraguay, un ♂.

Giscala intravirens n. sp. — 33 à 36 mill. — Dessus des supérieures avec la côte et le tiers terminal bruns, le reste de l'aile d'un vert jaunâtre. Un point cellulaire noir entouré de vert sombre, base de l'aile vert sombre et une rangée extracellulaire de six traits noirs, intranervuraux, accompagnés d'atomes bleuâtres. Dessus des inférieures brun avec un commencement de ligne subterminale plus foncée, semée d'atomes bleuâtres vers l'apex. Franges brunes. Antennes doublement pectinées ; tête et corps bruns.

Trois ♂ dont deux provenant du Venezuela et un de Paranapanema, province de Saint-Paul, Brésil.

Adrocampa ? insulsa n. sp. — 53 mill. — Dessus des quatre ailes blanc grisâtre sale, les supérieures avec quelques rares atomes bruns et un petit point cellulaire peu distinct; les inférieures poilues. Dessous blanchâtre un peu luisant. Franges couleur du fond. Antennes finement pubescentes; dessous des palpes brun ; dessus, front et thorax, blanchâtres.

Loja; un ♂.

Pseudypsia dilectata n. sp. — 50 mill. — Dessus des quatre ailes blond semé de brun à la côte, à la base et dans la partie cellulaire des supérieures, sur l'emplacement de la ligne extracellulaire des inférieures; traversé en outre de lignes indécises d'un blanc rosé laiteux, la plupart des nervures prenant cette même couleur; les supérieures enfin avec la réniforme en forme de croissant allongé, brune, cerclée de blanc. Franges bien découpées, blondes. Dessous uniformément blond pâle, les dessins bruns; ceux-ci se

composent de plusieurs lignes communes, peu nettes, du point cellulaire et, aux supérieures, de la réniforme; franges concolores. Antennes à double pectination, corps et pattes couleur du fond.

Loja; un ♂.

Simplicia? producta n. sp. — 41 mill. — Dessus des supérieures gris brun, la base gris roux, avec un point cellulaire noir, une ligne extracellulaire noire fortement sinuée et quelques éclaircies intranervurales jaune roux suivies de points terminaux de même nuance. Franges gris brun. Dessus des inférieures noirâtre, la première moitié plus claire; franges noirâtres. Dessous des quatre ailes noirâtre, brillant uni, plus clair à la base des inférieures et au bord interne des supérieures. Palpes avec le second article poilu dépassant le vertex de moitié de leur longueur, à troisième article également très long et nu; antennes finement ciliées; tête brune, thorax et dessus du corps gris roux. Secondes ailes avec les nervures 4 et 5 émises de l'angle inférieur de la cellule.

Popayan (Colombie), un ♂.

Darna formosa n. sp. — 31 mill. — Dessus des ailes noir, la base avec des reflets bleu métallique; supérieures traversées par une très large bande médiane, jaune, assez carrée, laissant la côte noire et finissant sur la 1 avant l'angle interne. Inférieures avec une bande costale jaune, plus large vers l'apex qu'elle n'atteint pas. Franges noires. Dessous gris métallique un peu argenté, les reflets bleus de la base très atténués, accompagnés de deux traits blanc argenté (l'un, sous-costal, aux premières ailes, le second, médian, aux inférieures) avec les bandes jaunes comme en dessus (la bande des supérieures atteignant la côte); franges gris argenté. Palpes et antennes noirs; front blanc; tête noire avec des reflets bleus, collier blanc; ptérygodes noires liserées de blanc, corps noir à reflets bleus; pattes noires et blanches.

Bolivie.

Cette espèce se place tout auprès d'*imparata* Wlk dont elle se distinguera aisément par la bande jaune des supérieures plus large, atteignant la 1 alors que celle d'*imparata* s'arrête sur la 2.

Phaeoclaena ovata n. sp. — 34 mill. — Dessus des quatre ailes noir, les supérieures avec une large tache ovale jaune paille, placée un peu avant le milieu, inclinée, s'étendant de la sous-costale à la 1; les inférieures avee la première moitié jaune paille. Franges noires. Dessous comme le dessus, le jaune paille plus pâle et les supérieures ayant en outre un petit trait paille subapical. Antennes garnies d'une double rangée de cils courts; tête, corps et pattes noirs.

Popayan, Colombie; une ♀.

Nemoria nigroapicalis n. sp. — 30 mill. — Les quatre ailes d'un beau vert uni assez clair mais vif, avec un petit point cellulaire rond, noir et une ligne commune d'un blanc mat très pâle; extracellulaire droite (sous certains reflets, cette ligne se remarque à peine); franges blanc verdâtre avec une petite touffe de poils noirs à l'extrémité apicale des supérieures. Dessous d'un vert jaunâtre plus pâle, tournant au blanchâtre à la côte et au bord terminal des ailes, sans trace de la ligne. Front et vertex blancs, cou et thorax verts; antennes jaunâtres à double pectination assez épaisse et courte, l'extrémité filiforme.

Popayan, Colombie; un ♂.

Anisodes raspata n. sp. — 34 mill. — Espèce excessivement voisine de *confirmaria* Wlk., mais plus grande, les supérieures plus acuminées, les quatre ailes à bord terminal bien denté, plus profondément sur les 4 et 6 aux inférieures. Dessus d'un gris carné assez clair, les lignes légèrement plus rosées et se détachant à peine du fond. Supérieures avec un petit point cellulaire blanc pur cerclé de brun, une ligne extrabasilaire arrondie, une médiane immédiatement après le point, une série extracellulaire, assez droite, de points brun brique nervuraux, une ligne subterminale, une série terminale de tout petits points, brun brique intranervuraux; la frange concolore avec une série de petits points brun brique à l'extrémité des nervures contresamplant les points terminaux. Inférieures avec les mêmes dessins, mais le point cellulaire trois à quatre fois plus gros, rond, brun et finement pupillé de clair. Dessous des ailes uni, rosé, plus blanchâtre aux inférieures, sans lignes, les séries de points tout petits ou disparaissant, les points cellulaires réduits à presque rien. Antennes bien bipectinnées à extrémité filiforme; front et devant des pattes rosés, vertex et dessus du corps couleur du fond.

Loja; deux ♂.

Anisodes spatara n. sp. — 36 mill. — Espèce fort voisine de la précédente, mais plus vigoureuse, à bords terminaux moins profondément dentés. Les quatre ailes teinte chêne clair, finement saupoudré d'atomes vineux, avec les séries suivantes de petits points bruns ou brun vineux : quelques petits points nervuraux sur l'emplacement de l'extrabasilaire, une série extracellulaire bien complète de petits points nervuraux qui se suivent très régulièrement; enfin une série terminale entre les nervures et dans la frange qui est concolore, une série de petits points à l'extrémité des nervures comme dans *raspata*. Les points cellulaires, couleur du fond, cerclés de brun, plus petits aux supérieures, un peu oblongs aux inférieures. Dessous des ailes paille, les supérieures avec la première moitié rosée; chaque aile possédant un point cellulaire arrondi,

brun, pupillé de paille rosé et deux lignes rosées : une centrale immédiatement après le point et une extracellulaire plus large aux supérieures et accompagnée de petits points nervuraux bruns. Quelques petits chevrons rosés terminaux entre les nervures. Frange paille. Antennes comme dans *raspata*; devant des cuisses de la première paire rosé; front chêne clair; tête et dessus du corps chêne clair finement saupoudré de vineux.

Loja; un ♂.

Anisodes suberea n. sp. — 29 mill. — Encore une espèce bien analogue anx précédentes, les supérieures bien acuminées mais les bords terminaux à peine dentés. Dessus des ailes teinte liège grisâtre, bien saupoudré d'atomes bruns, avec les mêmes séries de points — extrabasilaires, extracellulaires, terminaux et dans la frange — comme dans *spatara*; mais ces points qui sont bruns, deviennent tout à fait minuscules. Les quatre ailes sont en outre traversées par une ligne plus sombre, centrale, suivant immédiatement le point cellulaire aux secondes ailes, assez écartée de celui-ci aux supérieures; ces points cellulaires, plus larges aux inférieures, sont d'un lilacé blanchâtre, cerclés d'atomes bruns. Franges couleur du fond. Dessous grisâtre, plus pâle aux secondes ailes, les points cellulaires indiqués en brun et avec l'indication affaiblie de la ligne centrale; les lignes de très petits points extracellulaires et terminales se remarquent, mais incomplètes. Antennes très fortement bipectinées ; devant des cuisses et front légèrement vineux; vertex et dessus du corps couleur du fond.

Loja; un ♂.

Anisodes punctigera n. sp. — 31 à 35 mill. — Dessus des ailes gris testacé clair, semé de quelques rares atomes noirs et avec les mêmes séries de points que dans les espèces précédentes, sauf les différences suivantes : les points dans la frange à l'extrémité des nervures qui existent bien aux inférieures, disparaissent aux supérieures; les points terminaux sont bien séparés de l'extrême bord surtout aux premières ailes; sur la centrale, vaguement indiquée en rosé et qui s'écarte du point cellulaire, se remarquent quelques petits points nervuraux moins bien indiqués, de même une ligne chevronnée, parfois peu lisible, relie entre eux les points extracellulaires. Tous ces points sont petits, mais la plupart bien nets. Le point cellulaire aux supérieures est couleur du fond avec un peu de noir sur le bord extérieur, le point cellulaire des secondes ailes est plus gros, oblong, noir et contient plusieurs éclaircies testacées. Franges couleur du fond. Dessous grisâtre aux supérieures, plus clair aux inférieures avec les points cellulaires en noir et quelques traces des lignes de points. Antennes fortement bipec-

tinées, front mi-testacé mi-brun; vertex et dessus du corps couleur du fond et avec deux points noirs sur le bord du collier, deux points noirs à la base postérieure du thorax ; enfin deux plus petits points noirs latéraux sur chaque anneau de l'abdomen.

Loja; trois ♂.

Anisodes fastidiosa n. sp. — 29 à 32 mill. — Ailes bien élancées, les supérieures bien acuminées. Dessus des quatre ailes testacé clair semé de quelques rares atomes rougeâtres, avec les points cellulaires petits, brun rougeâtre, quelques points nervuraux à l'emplacement de l'extrabasilaire, une ligne indécise, peu nette, médiane, suivant de plus près le point cellulaire aux inférieures qu'aux supérieures, une série extracellulaire de points nervuraux, une série terminale de points internervuraux, enfin une série dans la frange (concolore) de très petits points à l'extrémité des nervures; tous ces points plus ou moins bruns ou rougeâtres. Dessous pareil, les points ou dessins moins nets ou effacés. Antennes bien bipectinées à extrémité filiforme; front testacé rayé de brun juste en dessous des antennes; vertex, thorax et dessus du corps couleur du fond des ailes.

Loja; trois ♂.

Dysephyra errabunda n. sp. — 30 à 34 mill. — Dessus des ailes testacé jaunâtre et semé d'atomes rougeâtres, traversé par deux lignes communes, plus foncées, irrégulièrement sinuées, assez parallèles et légèrement plus écartées entre elles aux inférieures. Ces deux lignes sont l'extracellulaire et la subterminale; les supérieures possèdent, en outre, une extrabasilaire. Aux quatre ailes le point cellulaire blanc, plus ou moins auréolé de noir ou de rougeâtre aux supérieures, un peu plus grand et bien cerclé de noir aux inférieures. Franges concolores. Dessous semblable, mais les supérieures plus ou moins teintées de rosé et sans la troisième ligne, les supérieures sans l'extracellulaire; les points cellulaires transformés en traits noirs. Antennes à double ciliation, l'extrémité filiforme; palpes à troisième article très court; front et devant des cuisses rougeâtres; thorax, corps et pattes couleur du fond des ailes.

Loja et El Monje; six ♂.

Dysephyra noverca n. sp. — 29 mill. — Dessus des ailes testacé, finement semé d'atomes noirs, chaque aile avec un petit point cellulaire noir et une vague indication de lignes qui ne se laissent pas décomposer et qui sont : aux supérieures, une extrabasilaire arrondie; aux quatre ailes, une extracellulaire se coudant bien aux secondes ailes à la hauteur du point; enfin, également aux quatre ailes et mieux marquée, une subterminale sinuée et accompagnée

de quelques points et traits noirs. Chaque aile avec une série terminale de points noirs intranervuraux, la frange concolore avec quelques petits traits noirs à l'extrémité des nervures. Dessous blanc sale luisant, les supérieures lavées de gris avec le point, l'indication d'une fine extracellulaire, une série subterminale de chevrons bruns bien indiqués encadrant une série terminale de traits intranervuraux bruns sur un liseré de même nuance. Ces deux dernières lignes ne sont plus que vaguement indiquées aux inférieures dont le point cellulaire est également fort petit. Franges comme en dessus. Antennes et palpes comme dans l'espèce précédente; corps et pattes couleur du fond.

Loja; un ♂.

Dysephyra subrosea n. sp. — 25 mill. — Dessus des ailes brun rougeâtre clair, finement semé d'atomes rougeâtres, les lignes un peu comme dans *errabunda*, mais fondues dans le fond et ne se laissant que difficilement apercevoir, sauf quelques points mieux indiqués sur la subterminale. Les supérieures avec deux points cellulaires rougeâtres, le premier petit, le second à l'extrémité de la cellule, beaucoup plus gros; les inférieures avec un petit point cellulaire moins bien indiqué. Franges, tête et corps concolores. Dessous des supérieures rosé, des inférieures jaunâtre, rosé à l'apex; chaque aile avec le point cellulaire et une très vague indication de la subterminale. Franges concolores. Antennes et palpes comme dans les espèces précédentes.

Loja; un ♂.

Organopoda? sabularia n. sp. — 29 mill. — Dessus des ailes testacé rougeâtre, chaque aile avec un point cellulaire noir bien marqué et l'indication assez confuse des lignes suivantes, plus sombres : une extrabasilaire, commune, bien arrondie aux inférieures où elle arrive tout auprès du point, une extracellulaire aux supérieures, coudée et touchant le point extérieurement; enfin, une subterminale accompagnée de points peu marqués vers l'apex des supérieures, puis fondue dans le fond. Franges concolores avec quelques atomes noirs à l'extrémité des nervures. Dessous testacé clair avec les points cellulaires, l'apex des ailes blanchâtre précédé, surtout aux supérieures, d'une large ombre brune. Antennes très finement pubescentes; palpes dépassant la tête de deux longueurs, le troisième article glabre et aussi long que le second. Tête et dessus du corps couleur du fond.

San-Francisco près Loja; une ♀.

Cambogia seria n. sp. — 18 mill. — Inférieures coudées sur 3, 4 et 6. Dessus des ailes d'un brun vineux uniforme, les quatre

ailes avec un petit point cellulaire noir et une ligne testacé pâle commune, subterminale, bien sinuée, un peu élargie au sommet des supérieures où elle fait un crochet vers la côte, les supérieures ayant une seconde ligne de même nuance avant le point cellulaire, laquelle se continue aux inférieures par une ligne noire passant sur le point cellulaire. Côte des premières ailes striées de clair. Bords terminaux coupés entre les nervures de petits points ou traits testacés, les nervures semées en maints endroits de testacé. Franges concolores avec quelques éclaircies. Dessous d'un vineux plus pâle avec la ligne subterminale commune et les points cellulaires comme en dessus, mais les points terminanx atrophiés, la seconde ligne claire des supérieures disparaissant et remplacée par une extrabasilaire noire egalement commune, enfin, avec une ligne médiane noire aux supérieures. Franges concolores. Antennes fortement bipectinées, les extrémités filiformes; front brun vineux; vertex testacé; thorax brun vineux avec un collier testacé; dessus du corps brun vineux avec une petite crête médiane testacée.

Loja; un ♂.

Cambogia acerba n. sp. — 20 mill. — Inférieures coudées sur la 4. Dessus des ailes vert pâle avec le point cellulaire noir et une ligne commune subterminale, blanche, sinuée et rentrant vers la côte aux supérieures, droite avec un léger coude vers la côte aux inférieures, possédant une seconde ligne également commune, médiane, brune, sinuée, contournant intérieurement le point cellulaire aux premières ailes, passant sur le point aux secondes. Cette ligne est à peu près invisible dans le second exemplaire. Dans le premier exemplaire, l'espace médian entre ces deux lignes s'obscurcit d'une ombre brune, très intense au centre des supérieures. Quelques petits points bruns terminaux, peu marqués, entre les nervures. Dessous d'un verdâtre très pâle, les points cellulaires peu marqués, les supérieures avec les deux tiers costaux légèrement lilacés, les inférieures avec une pâle indication de l'espace médian. Antennes fortement bipectinées à extrémité filiforme; front brunâtre; vertex et dessus des antennes blancs, collier brunâtre; thorax et dessus du corps vert pâle.

Loja, deux ♂.

Amaurinia auruda n. sp. — 17 et 20 mill. — Dessus des ailes vert d'eau un peu jaunâtre, à reflets argentés sous un certain angle; chaque aile avec un point cellulaire brun, une ligne extracellulaire plus pâle, arrondie extérieurement; les supérieures traversées, en outre, par une ligne assez droite passant sur le point cellulaire, avec la côte coupée de paille et de rosé; les quatre ailes très finement liserées de rosé; les franges paille. Dessous des ailes blanc verdâtre

assez fortement teinté de rosé aux supérieures et à l'apex des inférieures; les dessins du dessus reparaissant à peine; franges paille. Antennes à forte pectination double et l'extrémité filiforme ; vertex blanc; front et dessus du corps couleur du fond.

Loja et vallée de la Zamora; deux ♂.

Erythrolophus bicolor n. sp. — 21 mill. — Ailes coudées sur la 4; le dessus divisé en deux par une ligne commune, droite, noire, bordée de chaque côté de gris marron et du côté intérieur, d'un liseré rosé, quittant le bord abdominal un peu plus près de l'angle anal que de la base et se dirigeant droit sur l'apex des supérieures. Intérieurement à cette ligne la teinte est d'un brun plus pâle lavé de rosé, extérieurement d'un brun plus sombre. Les supérieures avec le point cellulaire et une ligne extrabasilaire plus fine, rosée, assez droite; aux quatre ailes une série de chevrons terminaux noirs, auréolés de rosé. Franges brunes. Dessous gris brun rosé, avec les points cellulaires, une fine ligne commune noire, un peu arrondie et les chevrons terminaux noirs. Antennes finement pubescentes; tête et corps couleur du fond.

Zamora près Loja; un ♂.

Craspedia taciturna n. sp. — 21 à 22 mill. — Dessus des quatre ailes gris brun, à reflets rosés sous un certain jour, traversé par plusieurs très fines lignes communes plus foncées, se perdant presque dans le fond, savoir : une extrabasilaire un peu arrondie, une médiane à peu près parallèle, une extracellulaire un peu plus sinuée, enfin, aux supérieures, une subterminale peu distincte; chaque aile avec le point cellulaire plus sombre. Franges concolores. Dessous plus pâle que le dessus, avec les traces des mêmes dessins. Antennes fasciculées; front, tête et corps couleur du fond.

Loja; plusieurs ♂.

Graphipidus ? pilosa n. sp. — ♂ 35, ♀ 31 mill. — Les quatre ailes semi-diaphanes d'un gris pâle uni, luisant; franges concolores. Dessous semblable, le ♂ avec l'emplacement de la cellule des inférieures couvert d'une épaisse couche de longs poils. Antennes grises, bipectinées chez le ♂, très finement pubescentes chez la ♀; tête et cou d'un beau jaune, reste du corps et pattes gris.

Paramba, Équateur ; deux ♂ et une ♀.

Eucosmia pravata n. sp. — 26 mill. — Dessus des supérieures gris blond traversé par une foule de petites lignes sinuées, parallèles, brunes, la terminale finement chevronnée de blanc; un assez gros point cellulaire brun. Dessus des inférieures blond, les dessins du dessous se voyant par transparence. Dessous des quatre ailes gris blond, une extracellulaire commune bien délimitée et la trace

d'une subterminale sinuée, accompagnée de petits points terminaux blancs. Le point cellulaire mieux indiqué aux secondes ailes. Franges blondes. Antennes filiformes ; corps et pattes couleur du fond.

Bolivie ; un ♂.

Cataclysme? napassa n. sp. — 24 mill. — Dessus des supérieures gris noisette avec une foule de lignes pâles et de dessins gris marron assez difficiles à décomposer. Vers la base l'aile est traversée par une fine ligne pâle, droite, suivie peu après par trois autres lignes également pâles, mais sinuées cette fois et exactement parallèles; vient alors un espace médian, gris marron, deux fois plus large à la côte qu'au bord interne, contenant le point cellulaire noir et complètement rempli de lignes pâles formant au centre comme un chapelet de ronds et motifs inégaux. Le bord extérieur de cet espace médian est coudé sur la 4 et accompagné d'une ligne pâle, suivie elle-même d'une série de lignes chevronnées pâles, jusqu'au bord terminal. Dessus des inférieures gris pâle, avec un très petit point cellulaire, une extracellulaire arrondie, plus sombre, accompagnée d'une ligne pâle et l'indication d'une série subterminale et terminale de lignes chevronnées pâles comme aux premières ailes. Franges concolores avec un liseré pâle. Dessous des quatre ailes gris brunâtre avec les points cellulaires, l'indication de quelques lignes vagues et une série de points subterminaux dont trois, marqués de blanc, plus nets à l'apex des supérieures. Antennes bipectinées, corps brun, les anneaux liserés en clair.

Loja; un ♂.

Cette espèce rappelle *Thamnonoma panassa* Druce.

Cidaria subalbata n. sp. — 33 mill. — Dessus des supérieures brun mousse avec quelques éclaircies au bord interne et à l'apex; la côte coupée d'un peu de blanc peu avant celui-ci. Les dessins, fondus dans le fond, plus foncés, se composent d'une ligne extrabasilaire arrondie, d'une centrale coudée très anguleuse et d'une subterminale indécise. Dessus des inférieures et franges brun noir. Dessous des supérieures brun noir avec la moitié interne de la base blanche, quelques petits traits jaunes à l'extrémité de la cellule et une petite éclaircie blanche sur la côte comme en dessus. Dessous des inférieures blanc avec une bordure terminale brun noir s'élargissant beaucoup à l'apex. Franges brun noir. Antennes filiformes; tête et thorax mousse; dessus de l'abdomen brun noir ; pattes et dessous du corps semés de blanc.

Colombie ; un ♂.

Cidaria simplex n. sp. — 22 mill. — Dessus des supérieures grisaille pâle brillant sans autres dessins apparents que deux séries

de très petits points noirs nervuraux, d'ailleurs incomplètes : une extrabasilaire et une extracellulaire. Ces petits points se distinguent à peine à l'œil nu. Dessus des inférieures blanc crémeux brillant. Franges concolores. Dessous des quatre ailes grisaille pâle avec l'indication des points cellulaires et d'une série extracellulaire de petits points nervuraux. Antennes crénelées finement pubescentes; palpes longs, droits, poilus; tête et corps couleur du fond.

Pifo, Équateur; un ♂.

Hastina ternura n. sp. — 23 mill. — Les quatre ailes paille très pâle luisant, traversées par diverses lignes jaune brun comme suit : aux supérieures, une basilaire arrondie, une extrabasilaire mal indiquée, une centrale et une extracellulaire sinuées, se regardant, plus écartées à la côte qu'au bord interne, l'extracellulaire géminée; aux inférieures,l'extrabasilaire peu marquée et l'extracellulaire également géminée. Chaque aile avec le point cellulaire. Franges concolores. Dessous pareil, les dessins plus effacés. Antennes filiformes, tête et corps concolores.

Loja; un ♂.

Erateina subtristata n. sp. — 29 mill. — Port de *Whitelei* Druce; mais les inférieures à angle anal non proéminent. Les quatre ailes brun noir; les supérieures avec une double tache d'un blanc vitreux, oblongue,la première partie cellulaire,la seconde,en prolongement, entre 3 et 4; bord interne finement blanc. Inférieures avec une large tache centrale, blanc mat, plus allongée sur la 5. Franges brunes avec une éclaircie blanche aux inférieures entre 5 et 6. Dessous brun rouge, la côte et les veines marquées en jaune dans la première moitié; supérieures avec la tache comme en dessus, mais se continuant par deux taches blanc mat, d'un côté jusqu'à la côte, de l'autre jusqu'à la 2, le bord interne blanc et deux traits blancs vers la base, l'un cellulaire, l'autre sous-médian ; avec, en outre, une ligne subterminale jaune, ondulée, s'arrêtant après la 2. Inférieures avec la tache blanche centrale se développant de la côte au bord abdominal et une ligne subterminale ondulée, jaune. Franges brun rouge, ponctuées de blanc vers l'apex aux supérieures, à l'angle anal, entre 2 et 3, 3 et 4, 5 et 6 aux supérieures. Front blanc et brun; ptérygodes brunes garnies de longs poils jaunâtres; corps brun annelé de blanc; dessous des palpes, des pattes et de l'abdomen blancs.

Bolivie.

Bapta perita n. sp. — 29 à 31 mill. — Les quatre ailes blanc argenté, traversées par de larges lignes très légèrement plombées, à bords indécis, savoir : aux supérieures, une médiane droite jus-

qu'au très petit point cellulaire qu'elle contourne pour atteindre de suite la côte, une extracellulaire et une subterminale, à peu près parallèles et légèrement coudées avant la côte. Aux inférieures, une extracellulaire et une subterminale arrondies. Un très petit point cellulaire (dans l'un de mes exemplaires les points cellulaires se laissent à peine deviner). Côte des supérieures liserée de jaune. Dessous blanc argenté, les points cellulaires peu sensibles et avec l'indication, par transparence, des lignes du dessus. Franges blanches, dessus et dessous. Antennes simples, jaunes; front brun; vertex, thorax et corps blancs.

Loja; trois ♂.

Bapta admota n. sp. — 26 mill. — Dessus des quatre ailes blanc avec quelques stries plus sombres sur les bords terminaux et les lignes suivantes, assez épaisses, très pâles et peu distinctes : aux supérieures, une médiane, une extracellulaire et une subterminale; aux inférieures, les deux dernières seulement, bien arrondies. La médiane et l'extracellulaire des premières ailes sont caractéristiques; très rapprochées au bord interne, la première traverse l'aile presque droite, la seconde se coude à la hauteur de la cellule et, à la côte, les deux lignes sont au moins deux fois plus écartées qu'au départ. Côte des supérieures finement liserée de blond. Dessous des ailes uniformément blanc. Franges blanches. Antennes simples, blondes; front brun; vertex et thorax probablement blancs, mais ternis dans mon exemplaire.

Lojà; un ♂.

Nipteria maturata n. sp. — 38 à 41 mill. — Ailes arrondies, d'un gris testacé clair uni, les supérieures un peu transparentes dans la première moitié, plus opaques dans la partie terminale, les points cellulaires se devinant. Dessous d'un gris plus sombre, sans dessins apparents, mais les points cellulaires mieux indiqués. Antennes des ♂ doublement pectinées, des ♀ à peine pubescentes; franges, tête, corps et pattes couleur du fond.

Loja; deux ♂ et deux ♀; l'un des ♂ pris le 23 avril 1900, l'une des ♀ le 12 avril de la même année au séminaire même de Loja. La chenille est marquée comme vivant sur l'alisier.

Cette espèce a l'aspect d'un diminutif d'*incoloraria* Gn., mais les ailes sont plutôt plus arrondies, la transparence aux supérieures plus grande, point de ligne du dessous bien ponctuée sur les nervures comme dans l'espèce brésilienne. Elle rappelle aussi *conjunctiva* Warr., mais la tête jaune de celle-ci l'en distinguera de suite. Enfin, elle a beaucoup de points communs avec *pardata mihi*, mais, dans cette dernière, la teinte n'est plus unie, les supérieures, notamment,

ont la côte sablée de blanc et de gris; *pardata*, enfin, possède en dessous une extracellulaire fortement dessinée.

L'espèce pourrait-elle varier à ce point?

Nipteria erna n. sp. — 36 à 42 mill. — Dessus des ailes blanc sale, la côte et le bord terminal aux supérieures, la surface entière aux inférieures, sablés de gris. Sur la côte, aux supérieures, deux commencements de lignes, le premier vers le milieu immédiatement suivi du point cellulaire, le second, géminé, vers le second tiers. Une ombre subterminale sous l'apex; la frange blanche coupée de gris à l'extrémité des nervures. Les inférieures avec le point cellulaire, une ligne extracellulaire peu marquée et une ombre subterminale, la frange comme aux premières ailes. Dessous comme le dessus, mais plus sablé et tous les dessins beaucoup mieux indiqués, les ombres plus noires et très envahissantes dans quelques spécimens. Antennes bipectinées.

Loja, El Monje; une série de ♂.

Cette espèce se range auprès d'*exularia* Wlk. et s'en distinguera par sa taille plus grande, ses ailes plus blanches, les parties grises non unies de ton, mais sablées. En outre, dans *exularia* typique, la ligne extracellulaire des supérieures est complète et simple; dans *erna*, elle est double et n'apparaît qu'à la côte.

Nipteria cucula n. sp. — 35 mill. — Dessus des quatre ailes gris pâle, les dessins du dessous se voyant par transparence et foncant la tonalité. Les supérieures traversées par deux lignes brunes, bien indiquées et parallèles : une extrabasilaire à peine coudée à la côte et une extracellulaire suivant immédiatement le point cellulaire et bien coudée à la hauteur de la cellule, puis droite. Côte brune au départ avec quelques éclaircies blanches; franges blanches et grises. Dessous gris, la côte et le bord terminal des supérieures, toute la surface des inférieures fortement striés de brun; les supérieures avec le point cellulaire et les deux lignes du dessus se voyant par transparence, les inférieures avec le point cellulaire et une ligne extracellulaire arrondie, assez épaisse et régulière. Franges comme en dessus. Antennes bipectinées; tête et thorax bruns, corps gris.

El Monje près Loja; un ♂.

Se range auprès de *lexuria* Dgn.; la ligne extracellulaire suivant immédiatement le point est bien particulière dans cette espèce.

Nipteria albida n. sp. — 52 mill. — Dessus des quatre ailes blanc crémeux; les supérieures avec la côte coupée par trois taches brun pâle, celle du milieu, plus marquée, donnant naissance à une rangée extracellulaire de petits points nervuraux, un trait à l'extrémité de la cellule; les inférieures avec le point cellulaire. Franges

des supérieures brun pâle, des inférieures crémeuses, coupées de brun pâle à l'extrémité des nervures. Dessous des supérieures comme le dessus, mais la côte et le bord terminal saupoudrés de brun pâle, plus largement à l'apex et la ligne de points nervuraux se transformant en une ligne brune fine, très nette, sinuée et continue. Dessous des inférieures entièrement saupoudré de brun pâle avec un gros point basilaire blanc, le point cellulaire bien indiqué et une ligne extracellulaire brune, sinuée, fine, très nette et continue faisant suite à celle des supérieures; la frange comme en dessus. Antennes bipectinées; dessus du corps blanchâtre, dessous grisâtre.

Chanchamayo, Pérou; un ♂.

Du groupe de *Cassaria* Gn.; la ligne extracellulaire si particulière du dessous distinguera aisément cette espèce de toutes celles déjà connues.

Cidariophanes incondita n. sp. — ♂ 40, ♀ 48 mill. — Port d'*indentata* Warr., mais les bords terminaux moins profondément dentés. Dessus des supérieures mousse mélangé de brun lilacé avec une large bande médiane où le brun domine; dans les deux sexes, le bord intérieur de cette bande est le même, assez droit, à peu près deux fois plus éloigné de la base au bord interne qu'à la côte; le bord externe, par contre, semble différent. Dans la ♀ il émet un coude à trois pointes sur 2, 3 et 4 pour, de la 4, rejoindre la côte en ligne droite et en dehors de la cellule; dans le ♂, le bord fait saillie sur la 2, puis rentre dans la cellule pour la traverser et rejoindre la côte, longeant intérieurement entre 1 et 2, puis à la hauteur de la cellule, deux taches plus claires dont la seconde semble absente dans la ♀. J'hésite d'autant moins à réunir cette paire qu'elle semble bien identique partout ailleurs et que, dans ce groupe, les dessins semblent parfois inconstants suivant le plus ou moins d'intensité qu'aura accidentellement telle ligne ou telle tache. Les deux sexes montrent les traces d'une subterminale blanche et ont le bord terminal chevronné de noir entre les nervures. Frange brun lilacé. Dessus des inférieures noirâtre avec les traces d'une ombre subterminale et la frange plus pâle. Dessous des ailes identique dans les deux sexes : grisaille avec un point cellulaire aux inférieures, une ombre subapicale aux supérieures et quelques chevrons noirs auréolés de blanc aux quatre ailes. Antennes simples, brunes, tigrées de jaune; tête et thorax mousse et brun.

Loja, El Monje; une paire.

Loxaspilates torcida n. sp. — 27 mill. — Supérieures assez acuminées. Dessus des ailes grisâtre à reflets légèrement rosés, avec quelques rares petites stries noires et une ligne brune, commune, centrale et à peine courbée aux inférieures et se continuant aux

supérieures en ligne droite, oblique, contournant le point cellulaire où elle fait un crochet pour s'arrêter sur la sous-costale; point cellulaire très gros et brun. Dessous grisâtre aux inférieures, jaunâtre aux supérieures avec une foule de stries noires et l'indication de la ligne et des points cellulaires. Franges concolores. Antennes simples.

Loja; un ♂.

Therina? nudata n. sp. — 35 mill. — Ailes un peu diaphanes; les supérieures, blond pâle, traversées par une large bande médiane plus sombre dans laquelle on devine le point cellulaire, à bord interne à peine arrondi, le bord externe droit jusqu'à la 6; cette bande est plus large à la côte qu'au bord interne. Inférieures blond pâle. Franges concolores. Dessous comme le dessus, la bande des supérieures encore un peu moins apparente. Antennes bipectinées; tête et corps concolores.

Loja; un ♂.

Thysanopyga albopunctaria n. sp. — 33 mill. — Dessus des supérieures brunâtre un peu violacé, la côte et une assez large bande subterminale interrompue d'un fauve sale, avec un point cellulaire blanc et trois lignes transversales marron, savoir: une extrabasilaire, une centrale assez droite sur laquelle se trouve le point, une extracellulaire légèrement coudée intérieurement. Dessus des inférieures fauve sale avec trois lignes comme aux supérieures mais plus pâles et la troisième arrondie, un tout petit point cellulaire blanc suivant l'extrabasilaire. Franges brunâtres. Dessous des quatre ailes grisâtre avec une ombre subapicale plus foncée aux premières ailes. Antennes garnies d'une double rangée d'assez longs cils, l'extrémité filiforme; palpes courts, poilus.

El Monje, près Loja; un ♂.

Sabulodes pumilis n. sp. — 27 mill. — Dessus des quatre ailes testacé jaunâtre, finement semé d'atomes brunâtres, chaque aile avec un petit point cellulaire brunâtre et des lignes de points nervuraux de même nuance, comme suit : aux supérieures, trois points sur l'emplacement de l'extrabasilaire et une série de points sur l'extracellulaire partant de la côte peu avant l'apex, s'enfonçant dans l'aile en se rapprochant de plus en plus du centre et atteignant le bord interne peu après le milieu; aux inférieures, une série extracellulaire arrondie, peu éloignée du point cellulaire. En outre, de ces séries de points nervuraux, l'on devine une ligne subterminale plus sombre, mais diffuse. Franges concolores. Dessous d'un testacé plus pâle, avec les points cellulaires et une série commune arrondie de points subterminaux; les supérieures avec une ombre subterminale

brunâtre. Franges concolores partiellement coupées de brunâtre à l'extrémité des nervures. Antennes simples ; tête et corps concolores.

Pifo, Équateur; un ♂.

Apicia venusta n. sp. — 20 mill. — Jolie petite espèce du groupe de *polygrapharia* H. Sch. Bord terminal des supérieures à apex moins profondément falqué; dessus des quatre ailes jaune paille, semé de quelques atomes noirs, avec les points cellulaires noirs, petits, mais nets et les lignes suivantes : aux supérieures, la trace d'une première ligne quittant le bord interne au premier tiers et se dirigeant droit sur le point cellulaire, puis une seconde ligne géminée partant du bord interne au second tiers et aboutissant en droite ligne à l'apex, la ligne extérieure plus large et d'un brun roux plus foncé; aux inférieures, une première ligne plus fine, droite, précédant immédiatement le point cellulaire, puis, peu au delà, une double ligne (l'intérieure plus foncée) absolument parallèle, enfin, une dernière ligne subterminale, toujours droite et parallèle, fine et moins distincte. Les supérieures avec l'espace entre la seconde ligne et le bord terminal rembruni, marqué de deux gros points subterminaux noirs sur 2 et 3. Frange concolore aux inférieures, un peu rembrunie aux supérieures. Dessous comme le dessus, mais de teinte moins franche, les dessins moins colorés et moins nets. Antennes pubescentes; tête et corps couleur du fond.

Loja; un ♂.

Je crois pouvoir marier à cette espèce la ♀ suivante, également de Loja : 24 mill.; supérieures à apex pointu et à peine coudées sur la 4; teinte paille uniforme en dessus, plus sablée en dessous, les lignes exactement semblables à celles du ♂, la seconde des supérieures accompagnée intérieurement de points sur 1, 3, 4, 6 et 7, les quatre ailes avec la trace de points subterminaux sur 1, 2 et 3. Antennes filiformes.

Mychonia tepida n. sp. — 26 mill. — Port de *corticinaria* H. Sch. avec laquelle cette espèce a les plus grandes ressemblances. Dessus des supérieures mordoré, légèrement brunâtre dans la moitié extérieure apicale, avec un gros point cellulaire brun et deux fines lignes noires, continues (et non des lignes de points comme dans l'espèce d'Herrich-Schaeffer). La première, extrabasilaire, formant un V double et dont les deux pointes, regardant la base, sont sur la 1 et la médiane; la seconde, subterminale, quittant le bord interne vers le troisième quart, un peu courbe, puis se dirigeant droit sur la 6 où elle se coude fortement avant d'atteindre la côte ; les deux lignes trois ou quatre fois plus écartées à la côte qu'au bord interne. Quelques stries noires basilaires et terminales et une

ombre blanche apicale. Dessus des inférieures mordoré pâle avec une fine ligne subterminale interrompue et quelques stries noires. Franges blondes, plus sombres à la base. Dessous des quatre ailes jaune sale avec de nombreuses stries noires et une vague indication des lignes du dessus semant, cette fois ci, des points nervuraux. Les supérieures avec le point cellulaire et l'éclaircie apicale. Antennes simples; tête et thorax mordoré.

Loja; un ♂.

Mychonia infuscata n. sp. — 25 mill. — Bord terminal des supérieures à peine falqué à l'apex. Dessus des premières ailes d'un ocre mordoré plus ou moins bruni, semé d'atomes bruns, avec un gros point cellulaire brun marron et deux lignes de points nervuraux noirs. La première, extrabasilaire, arrondie, les points ponctués intérieurement de blanc; la seconde, subterminale, courant comme dans *corticinaria*, les points ponctués extérieurement de blanc. Côte coupée de brun et de blanc, avec une demi-lunule blanche avant l'apex; frange couleur du fond. Dessus des inférieures d'un ton plus clair, semé d'atomes bruns, avec un tout petit point cellulaire et une série subterminale, disposée comme dans *corticinaria*, de points nervuraux noirs ponctués extérieurement de blanc; frange concolore. Dessous comme le dessus, mais de tonalité plus claire et les lignes de points en partie incomplètes. Antennes simples; tête et thorax couleur du fond, ce dernier ponctué de noir.

Loja; trois ♂.